MPI–PhE/00–06
April 2000

Messung von 3-Jet-Ereignissen in tiefunelastischer e-p-Streuung mit dem H1-Detektor bei HERA

Dissertation
zur Erlangung des Doktorgrades
des Fachbereich Physik
der Universität Hamburg
Max-Planck-Institut für Physik, München
(Werner-Heisenberg-Institut)

vorgelegt von

Renate Mohr

Hamburg
2000

Messung von 3-Jet-Ereignissen in tiefunelastischer e-p-Streuung mit dem H1-Detektor bei HERA

Dissertation

Renate Mohr
Universität Hamburg
Fachbereich Physik

angefertigt in der Gruppe des
Max-Planck-Instituts für Physik, München
Werner-Heisenberg-Institut
am Deutschen Elektronen Synchrotron, Hamburg

Hamburg

Februar 2000

Gutachter der Dissertation:	Prof. Dr. B. Naroska
	Prof. Dr. F.-W. Büßer
Gutachter der Disputation:	Prof. Dr. B. Naroska
	Prof. Dr. J. Meyer
Datum der Disputation:	25.2.2000

Kurzfassung

Die Arbeit stellt die Messung von 3-Jet-Ereignissen in der e-p-Streuung bei HERA im Bereich kleiner Impulsüberträge $5\ \mathrm{GeV}^2 < Q^2 < 100\ \mathrm{GeV}^2$ vor. Die Jets werden durch den longitudinal invarianten k_t -Algorithmus im Breitsystem definiert.
Wirkungsquerschnitte werden als Funktion von Q^2, der Bjorken-Skalen-Variable x_{Bj}, der mittleren transversalen Energie der Jets im Breitsystem $\overline{E}_{T,Breit}$ und der invarianten 3-Jet-Masse $\mathrm{M_{3jet}}$ gemessen. Im Schwerpunktsystem der drei Jets wird die Form der Dalitz-Variablen X_3 und X_4, sowie die Winkelvariablen $\cos\Theta_3$ und Ψ_3, die die Lage der Jets bzgl. der Protonrichtung charakterisieren, gemessen.
Die Daten werden mit Monte Carlo-Vorhersagen und einer QCD-Rechnung zur Ordnung $\mathcal{O}(\alpha_s^2)$ verglichen. Die Monte Carlo-Modelle haben Schwierigkeiten, die Wirkungsquerschnitte zu beschreiben, können aber die Form der Verteilungen des 3-Jet-Schwerpunktsystems recht gut wiedergeben. Die QCD-Rechnung ist bei hohen Werten von x_{Bj}, Q^2, $\overline{E}_{T,Breit}$ oder $\mathrm{M_{3jet}}$ in der Lage die Wirkungsquerschnitte zu beschreiben. Bei niedrigen Werten hingegen unterschreitet die QCD-Vorhersage die Daten. Die Verteilungen des 3-Jet-Schwerpunktsystems können durch die QCD-Rechnung gut beschrieben werden.
Es zeigt sich, daß die QCD-Dynamik Konfigurationen bevorzugt, wo der dritte Jet parallel oder antiparallel zur Protonrichtung abgestrahlt wird.

Abstract

Measurements of three jet events in e-p-scattering at HERA in the low Q^2 regime of momentum transfer $5\ \mathrm{GeV}^2 < Q^2 < 100\ \mathrm{GeV}^2$ are presented. Jets are defined by the longitudinal invariant k_t -Algorithm in the Breit frame.
Cross sections as function of Q^2, the Bjorken scaling variable x_{Bj}, the mean transverse energy of the jets in the Breit frame $\overline{E}_{T,Breit}$ and the invariant mass $\mathrm{M_{3jet}}$ have been measured. Moreover, the shape of the Dalitz variables X_3, X_4 and the two variables $\cos\Theta_3$ und Ψ_3 characterising the angular orientation of the jets in the three jet center of mass frame have been studied.
Data are compared to Monte Carlo models and to $\mathcal{O}(\alpha_s^2)$ QCD-calculations. Monte Carlo models have difficulties in describing the cross sections, but are able to reproduce the shape of the variables in the three jet center of mass frame. $\mathcal{O}(\alpha_s^2)$ QCD-calculations are able to describe the cross sections for large values of x_{Bj}, Q^2, $\overline{E}_{T,Breit}$ or $\mathrm{M_{3jet}}$. At low values, however, the prediction falls below the data.
It turns out that concerning the QCD radiation pattern the jet with the lowest energy is most likely emitted close to the direction of the proton beam.

E. Schrödinger:
"Das arithmetische Paradoxon - Die Einheit des Bewußtseins"

Zuweilen stellt ein Maler in sein großes Gemälde oder ein Dichter in sein langes Gedicht eine unscheinbare Nebenfigur, die er selbst ist. (...) Mir scheint dies das beste Gleichnis für die verwirrende Doppelrolle des Geistes. Einerseits ist er der Künstler, der alles geschaffen hat; im vollendeten Werk dagegen ist er nur eine unbedeutende Staffage, die getrost fehlen könnte, ohne die Gesamtwirkung zu beeinträchtigen. Wenn wir aber nicht in Gleichnissen reden wollen, so müssen wir bekennen, daß es uns jedenfalls bisher nicht gelungen ist, ein einigermaßen verständliches Weltbild aufzubauen, ohne unsern eignen Geist, den Schöpfer des ganzen Weltbildes, daraus zu verbannen, derart, daß darin für ihn kein Platz ist. Der Versuch, ihn hineinzuzwängen, führt notwendig zu Ungereimtheiten.
Ich habe schon früher die Tatsache erörtert, daß aus dem gleichen Grunde im physikalischen Weltbild alle Sinnesqualitäten fehlen, aus denen das Subjekt der Erkenntnis sich eigentlich zusammensetzt. Dem Modell fehlen Farben, Töne, Greifbarkeit. Ebenso und aus dem gleichen Grunde mangelt der Welt der Naturwissenschaft alles, was eine Bedeutung in bezug auf das bewußt anschauende, wahrnehmende und fühlende Wesen hat; von alledem enthält sie nichts. Vor allem denke ich an die sittlichen und ästhetischen Werte, Werte von jeder Art, an alles, was auf Sinn und Zweck des ganzen Geschehens Bezug hat. Nicht nur fehlt dieses alles, sondern es kann von einem rein naturwissenschaftlichen Standpunkt aus überhaupt nicht organisch eingebaut werden. (...)
Am schmerzlichsten ist das völlige Schweigen unseres ganzen naturwissenschaftlichen Forschens auf unsere Fragen nach Sinn und Zweck des ganzen Geschehens. Je genauer wir hinsehen, um so zweckloser und sinnloser kommt es uns vor. Das Spektakel, das sich da abspielt, erhält einen Sinn offenbar nur in bezug auf den Geist, der ihm zuschaut. Was uns die Naturwissenschaft über diesen Bezug zu melden weiß, ist ausgemacht ungereimt. Als sei der Geist nur durch eben dieses Spektakel entstanden, dem er nun zuschaut, und als werde er mit ihm wieder vergehen, wenn die Sonne schließlich erkaltet sein und die Erde sich in ein Wüste von Eis und Schnee verwandelt haben wird.
Nur kurz will ich den notorischen Atheismus der Naturwissenschaft erwähnen, der natürlich zum gleichen Thema gehört. Wieder und wieder erfährt die Naturwissenschaft diesen Vorwurf, aber zu Unrecht. Der persönliche Gott kann in einem Weltbild nicht vorkommen, das nur zugänglich geworden ist um den Preis, daß man alles Persönliche daraus entfernt hat. Wir wissen: Wenn Gott erlebt wird, so ist das ein Erlebnis, genauso real wie eine unmittelbare Sinnesempfindung oder wie die eigene Persönlichkeit. Wie diese muß er im raum-zeitlichen Bilde fehlen. "Ich finde Gott nicht vor in Raum und Zeit", so sagt der ehrliche naturwissenschaftliche Denker. Und dafür wird er von denen gescholten, in deren Katechismus geschrieben steht: Gott ist Geist.

Aus: "Physik und Transzendenz - Die großen Physiker unseres Jahrhunderts über ihre Begegnung mit dem Wunderbaren"
(Hrsg. Hans-Peter Dürr, Scherz Verlag)

Inhaltsverzeichnis

Einleitung

Die Forschung auf dem Gebiet der Elementarteilchenphysik bemüht sich um ein verbessertes Verständnis vom Aufbau der Materie.
Streuexperimente nahmen dabei schon immer eine herausragende Stellung ein. Im Jahre 1911 beschoß E. Rutherford eine dünne Goldfolie mit α-Teilchen und konnte durch die dabei beobachtete, unerwartet starke Ablenkung der Teilchen auf die Existenz eines positiv geladenen Atomkernes rückschließen und veränderte damit die damaligen Vorstellungen vom Mikrokosmos.
Um tiefer in die Materie vorzudringen, wurden in den sechziger Jahren in Stanford (USA) beschleunigte Elektronen auf Protonen geschossen und ihre tiefunelastische Streuung (DIS) untersucht. Aufgrund dieser Messungen konnten Substrukturen im Proton nachgewiesen werden, die später mit den Quarks identifiziert wurden. Die so etablierten Elementarteilchen unterliegen den Wechselwirkungen aufgrund der starken, schwachen und elektromagnetischen Kraft, die im Rahmen des 'Standard Modells der Elementarteilchenphysik' beschrieben werden. Die fundamentalen Teilchen sind Quarks, Leptonen und Eichbosonen. Die Theorie, die die Phänomene der starken Wechselwirkung beschreibt, ist die Quantenchromodynamik (QCD). Tiefunelastische Lepton-Proton Streuexperimente spielen eine wichtige Rolle bei der Erforschung der Struktur des Protons und haben zum Verständnis der QCD beigetragen.
Am Elektron-Proton-Speicherring HERA in Hamburg kann die tiefunelastische Streuung im Vergleich zu vorhergehenden Experimenten mit ruhendem Ziel bei einer wesentlich größeren Schwerpunktsenergie ($\sqrt{s} \approx 300$ GeV) studiert werden.
HERA dringt damit in einen völlig neuen kinematischen Bereich vor, der sich auf Werte des Impulsübertrages Q^2 bis zu maximal 10^5 GeV^2 und einem minimalen Wert der Skalenvariable $x_{Bj} \approx 10^{-5}$ erstreckt.

Gegenstand dieser Arbeit ist der Test der QCD durch die Messung von Prozessen, die durch die starke Wechselwirkung ausgelöst werden. Die Daten wurden mit dem H1-Experiment genommen und anschließend analysiert. Mit der Messung von inklusiven Elektron-Proton-Wirkungsquerschnitten kann man Erkenntnisse über den Quarkinhalt des Protons gewinnen und ist nur indirekt sensitiv auf die Gluonen im Proton und die starke Kopplungskonstante α_s. Betrachtet man Ereignisse, die kollimierte Bündel von

Hadronen, sogenannte Jets, aufweisen, ist der analysierte Prozeß direkt proportional zur starken Kopplung. Multi-Jet-Wirkungsquerschnitte sind also ein geeigneter Ansatzpunkt zum Test der QCD. Bei H1 und ZEUS wurden mit den in früheren Jahren genommenen Daten mehrere Analysen zu 1- und 2-Jet-Ereignissen in allen zugänglichen kinematischen Bereichen durchgeführt. Mit der Luminosität, die in den Jahren 1996 und 1997 gesammelt wurde, sind erstmals ausreichend Daten vorhanden, um Ereignisse mit drei Jets zu untersuchen. In der vorliegenden Arbeit wird zum ersten Mal das 3-Jet-System bei Ereignissen mit kleinem Q^2 detailliert gemessen.

Die Arbeit gliedert sich wie folgt: Nach einer Einführung in die theoretischen Grundlagen der QCD wird der H1-Detektor vorgestellt. Kapitel 3 beschreibt die zum Vergleich mit den Daten herangezogenen Monte Carlo-Generatoren. Kapitel 4 umfaßt die Datenselektion mit der Erläuterung aller technischen Schnitte. Anschließend werden im Hauptkapitel 5 das 3-Jet-System vorgestellt und die einzelnen Schritte der Analyse erklärt. Die Ergebnisse mit dem Vergleich verschiedener Modelle, sowie deren Interpretation werden in Kapitel 6 zusammengefaßt.

Kapitel 1

Tiefunelastische Streuung und QCD

Streuexperimente sind das wichtigste Werkzeug zur Erforschung der Struktur der Materie. Der Begriff "Tiefunelastische Streuung" (engl. deep inelastic scattering, DIS) wurde 1969 geprägt, als am Beschleuniger-Experiment in Stanford (Stanford Linear Accelerator Center, SLAC) in der Elektron-Proton-Streuung Ereignisse beobachtet wurden, bei denen mit unerwartet großer Häufigkeit ein sehr großer Energieverlust des gestreuten Elektrons gemessen wurde. Diese Experimente ergaben experimentelle Hinweise auf eine Substruktur im Nukleon. Die gefundenen punktförmigen Konstituenten des Nukleons wurden 'Partonen' genannt, die später mit den Quarks identifiziert wurden. Schon 1966, noch bevor die Existenz von Quarks experimentell bestätigt wurde, stellte Bjorken die Hypothese auf [Bjo66, Bjo69], daß die Strukturfunktionen (s. Abschnitt 1.3) der tiefunelastischen Streuung bei großen Energie- und Impulsüberträgen Q^2 des Elektrons nur noch von einer Größe, der Bjorken-Skalenvariable x_{Bj} (s. Gl. 1.3) abhängen würde. Dieses Verhalten wurde Skaleninvarianz (oder 'scaling') genannt, denn x_{Bj} ist dimensionslos und es gibt keine relevante Massenskala mehr. Da die Struktur des Protons unabhängig von der Auflösung Q^2 ist, müssen die Partonen punktförmig sein.

In diesem Kapitel werden die theoretischen Grundlagen zur Beschreibung der tiefunelastischen Streuung erklärt und die dafür notwendigen Variablen definiert.

1.1 Das Quark-Parton-Modell

Die postulierte Skaleninvarianz wurde durch die ersten Messungen der Protonstrukturfunktion F_2 am SLAC bestätigt. Die einfachste Erklärung für das Verhalten von F_2 wird im Quark-Parton-Modell (QPM) gegeben.
Im Parton-Modell werden die Konstituenten des Protons als punktförmig angenommen. Sie werden im Limes großer Impulsüberträge ($Q^2 \to \infty$, "Bjorken-Limit") als freie Teilchen betrachtet.



Abbildung 1.1: *Graph einer tiefunelastischen Streuung im Quark-Parton-Modell*

Im Bezugssystem, in dem der Impuls des Nukleons sehr groß ist ("infinite momentum frame"), das bei HERA in guter Näherung dem Laborsystem entspricht, besteht das Proton aus einem Strom parallel fliegender Partonen, deren Transversalimpulse und Massen vernachlässigt werden können. Das Proton hat aufgrund der Lorentzkontraktion fast keine longitudinale Dimension und ähnelt deshalb einer Scheibe. Das Proton besteht im QPM aus drei punktförmigen, geladenen Quarks mit Spin-1/2, die sich den Impuls des Protons teilen. Die tiefunelastische Streuung wird interpretiert als elastische Streuung des vom Elektron ausgesandten virtuellen Photons an einem der Quarks. Die schematische Darstellung einer e-p-Streuung im Quark-Parton-Modell zeigt Bild 1.1. Dieser Prozeß findet in 0. Ordnung bzgl. α_s, der energieabhängigen Kopplung der starken Wechselwirkung (vergl. Abschnitt 1.4.1), statt.

1.2 Die Kinematik tiefunelastischer Streuung

Ein Streuprozeß kann mit Hilfe bestimmter kinematischer Variablen beschrieben werden. Die für HERA-Prozesse üblichen Variablen hinsichtlich der tiefunelastischen Streuung werden in diesem Abschnitt definiert. Nach der Kollision des Elektrons mit dem Proton werden das gestreute Elektron und ein System aus Hadronen beobachtet. Der Begriff Elektron wird hier stellvertretend für Positron oder Elektron verwendet, da zwar die verwendeten Daten der Analyse mit Positron-Proton-Kollisionen aufgezeichnet wurden, die theoretischen Grundlagen aber unter Vernachlässigung elektroschwacher Effekte dieselben sind. Der Prozeß ist in Abbildung 1.2 graphisch dargestellt und



Abbildung 1.2: *Graphische Darstellung einer tiefunelastischen e-p-Streuung. Das Proton bricht dabei in das hadronische System X mit der Masse W auseinander*

kann formal geschrieben werden durch

$$e(k) + P(p) \rightarrow e(k') + X \ . \tag{1.1}$$

Mit den Viererimpulsen der ein- und auslaufenden Teilchen lassen sich die grundlegenden kinematischen Größen berechnen, die zur Beschreibung des Prozesses verwendet werden.

$k = (E_e, \vec{p_e})$ Viererimpuls des einlaufenden Elektrons
$k' = (E'_e, \vec{p'_e})$ Viererimpuls des auslaufenden Elektrons
$p = (E_p, \vec{p_p})$ Viererimpuls des einlaufenden Protons

- $\boldsymbol{Q^2} = -q^2 = (k - k')$, die **Virtualität** des Photons
- $\boldsymbol{s}$, das Quadrat der **Schwerpunktsenergie**

$$s = (p + k)^2 \approx 4E_eE_p, \tag{1.2}$$

  wobei die Näherung unter Vernachlässigung der Elektron- und Protonruhemasse (m_p) gilt. Bei HERA ergibt sich s=$4 \cdot 27.55 \cdot 820$ GeV^2 = 90364 GeV^2

- $\boldsymbol{x_{Bj}}$, die **Bjorken-Skalenvariable**

$$x_{Bj} = \frac{Q^2}{2\,p \cdot q} \quad , \qquad Q^2 = x_{Bj}\,y\,s \tag{1.3}$$

  Im QPM läßt sich x_{Bj} als der longitudinale Impulsbruchteil des einlaufenden Quarks am Proton interpretieren.

- Die **Skalenvariable *y***,

$$y = \frac{p \cdot q}{p \cdot k} \tag{1.4}$$

entspricht im Ruhesystem des Protons dem Energieübertrag des Elektrons auf das ausgetauschte Photon.

- **W**, das Quadrat der **invarianten Masse des hadronischen Systems**:

$$W^2 = (p+q)^2 = Q^2 \, \frac{1-x}{x} + m_p^2 \approx sy - Q^2 \tag{1.5}$$

1.3 Wirkungsquerschnitt und Strukturfunktionen

Eine fundamentale Größe in der tiefunelastischen Streuung ist der Wirkungsquerschnitt für die Reaktion $e(k) + P(p) \to e(k') + X$. Der inklusive Wirkungsquerschnitt läßt sich darstellen durch den Ansatz:

$$d\sigma \sim L^{\mu\nu} \cdot W_{\mu\nu}, \tag{1.6}$$

bei dem die Reaktion separiert wird in einen leptonischen Tensor $L^{\mu\nu}$ zur Beschreibung des Elektron-Photon-Vertex und einen hadronischen Tensor $W_{\mu\nu}$, der alle Informationen über die Reaktion des Photons mit dem Proton enthält.
Differentiell kann der Wirkungsquerschnitt für Ereignisse mit neutralem Strom (NC), d.h. unter Austausch eines Photons oder Z^0-Bosons, geschrieben werden als

$$d\sigma_{NC} \sim |\mathcal{M}_{fi}|^2 d\nu dQ^2 d\Phi. \tag{1.7}$$

Hierbei charakterisiert das Matrix-Element $\mathcal{M}_{fi}$ den Übergang zwischen möglichen Anfangs- und Endzuständen (i,f) und $d\Phi$ den Phasenraum des hadronischen Systems im Endzustand. ν ist der Energieverlust des Elektrons im Protonruhesystem ($\nu = Pq/m_p$). Der Leptontensor ist das Produkt zweier elektromagnetischer Dirac-Ströme (s. [HM94]), das im Rahmen der Quantenelektrodynamik (QED) exakt berechnet werden kann. Hierbei wird der Beitrag des Z^0-Austausches in guter Näherung vernachlässigt, da er erst bei großen Q^2-Werten ab ca. 5000 GeV^2 ($Q^2 \approx M(Z^0)^2$) eine Rolle spielt und somit für die vorliegende Analyse nicht relevant ist. Der unbekannte Hadrontensor kann in diesem kinematischen Bereich unter Ausnutzung der Stromerhaltung und Lorentzinvarianz durch zwei unabhängige Struktur-Funktionen $F_1(x, Q^2)$ und $F_2(x, Q^2)$, bzw. $F_L = F_2 - 2xF_1$, ausgedrückt werden. Im QPM wird F_2 berechnet als die gewichtete Summe über Dichteverteilungen f_i der Quarks mit der Ladung e_i:

$$F_2(x) = \sum_{i=q,\bar{q}} e_i^2 \, x \, f_i(x) \; . \tag{1.8}$$

Der differentielle Wirkungsquerschnitt läßt sich schreiben als:

$$\frac{d\sigma_{NC}}{dxdQ^2} = \frac{4\pi\alpha^2}{x\,Q^2}\left[(1-y+\frac{y^2}{2})F_2(x,Q^2) - \frac{y^2}{2}F_L(x,Q^2)\right], \tag{1.9}$$

wobei α die elektromagnetische Kopplungskonstante darstellt. Dieser Ausdruck wird auch Born-Wirkungsquerschnitt genannt. Er kann auch geschrieben werden als

$$\frac{d\sigma_{NC}}{dxdQ^2} = \kappa\left[F_2(x,Q^2) - \frac{y^2}{Y_+}F_L(x,Q^2)\right] \quad , \tag{1.10}$$

$$\text{mit} \quad \kappa = \frac{2\pi\alpha^2}{\mathrm{x\,Q^2}}\,\mathrm{Y_+} \quad , \quad \mathrm{Y_+} = 2(1-\mathrm{y}) + \mathrm{y}^2\,.$$

F_L bezeichnet die longitudinale Strukturfunktion. Da der Beitrag von F_L zum DIS-Wirkungsquerschnitt von Gl. 1.9 proportional zu y^2 ist, wird der Wirkungsquerschnitt für Werte unterhalb von $y \approx 0.6$ dominiert durch den Beitrag von F_2.
Im Quark-Parton-Modell ist $F_L = 0$ für Fermionen, d.h. für Teilchen mit Spin 1/2, wie z.B. die Quarks.

1.4 Quantenchromodynamik

Die Feldtheorie der starken Wechselwirkung ist die Quantenchromodynamik (QCD). Es gibt sechs Quarksorten (Flavours) u,d,s,c,b,t, für deren Massen jeweils gilt:
$\mathrm{m_u} < \mathrm{m_d} < \mathrm{m_s}... < \mathrm{m_t}$. Die Quarks können in drei Zuständen auftreten, die als "Farbe" bezeichnet werden: rot, grün und blau (r,g,b). Die Antiquarks tragen dementsprechend Antifarbe $\bar{\mathrm{r}}, \bar{\mathrm{g}}, \bar{\mathrm{b}}$. Die starke Wechselwirkung ist invariant unter Transformationen, basierend auf der zugrundeliegenden Symmetriegruppe SU(3), die den Farbaustausch beschreibt.

Die Wechselwirkung wird durch die masselosen Eichbosonen, die Gluonen, vermittelt. Der nichtabelsche Charakter der SU(3)-Gruppe bewirkt, daß die Gluonen selbst Farbladung tragen, z.B einen $\mathrm{r}\bar{\mathrm{g}}$-Zustand bilden, und somit auch untereinander wechselwirken können. Diese Tatsache wirkt sich entscheidend auf die starke Kopplungskonstante α_s aus, deren Stärke, anders als in der QED, logarithmisch abnimmt mit steigendem Q^2. Im Grenzfall der asymptotischen Freiheit $Q^2 \to \infty$ geht $\alpha_s \to 0$ und die Quarks verhalten sich wie quasifreie Teilchen. In der Natur findet man keine freien Quarks, sie unterliegen dem sog. "confinement" (Einschluß). Die Kopplungskonstante wird beliebig groß ($\alpha_s \to \infty$) bei makroskopischer Betrachtung, wenn also $Q^2 \to 0$ geht. Die in der Natur beobachtbaren Teilchen sind immer farbneutral. Ihre Nettofarbladung wird durch Überlagerung von unterschiedlichen Farbzuständen durch den Zusammenschluß der Quarks in Mesonen oder Baryonen zu Null kompensiert.

1.4.1 Renormierung und α_s

Ein erfolgreiches mathematisches Werkzeug zur Berechnung von meßbaren Größen ist die Störungstheorie. Der Entwicklungsparameter in der QCD ist dabei α_s . Bei der Berechnung der Schleifenkorrekturen eines Prozesses treten bestimmte Singularitäten auf, die zu sogenannten "ultravioletten" Divergenzen führen ($\sigma \to \infty$ für Impuls $k \to \infty$).

Diese Pole werden der Prozedur der Renormierung unterzogen. Hierbei können durch die Einführung eines neuen Parameters, der Renormierungsskala μ_R und durch das Ersetzen der ursprünglichen Kopplungkonstante durch eine renormierte Kopplungskonstante, die auftretenden Pole subtrahiert werden. Somit bekommen die Integrale ein endliches Ergebnis. Das "Modifizierte minimale Subtraktionsschema" ($\overline{MS}$-Schema) stellt einen möglichen Formalismus dar, in dem die Renormierung durchgeführt werden kann (Renormierungsschema). Eine verständliche Einführung in die Formulierung von Störungstheorie und Renormierung findet man in [Sop97] und [ESW96].

Die Abhängigkeit der starken Kopplung von μ_R wird durch eine "Renormierungsgruppengleichung" mit Hilfe der QCD-β-Funktion formuliert:

$$\mu_R \frac{d\alpha_s(\mu_R)}{d\mu_R} = \alpha_s \cdot \beta(\alpha_s) = -\frac{\beta_0}{2\pi}\alpha_s^2 - \frac{\beta_1}{4\pi^2}\alpha_s^3 - \frac{\beta_1}{64\pi^3}\alpha_s^4 - ... \qquad (1.11)$$

Der Wert von α_s und die Form der Koeffizienten ab der Ordnung α_s^2 hängt stark vom Renormierungsschema ab. Daher sollte man bei Vergleichen von berechneten Größen oder Parametern wie α_s immer sicherstellen, daß in demselben Schema gerechnet wurde. Die Wahl von μ_R sollte mit der relevanten Skala des Prozesses verknüpft sein, z.B. der Virtualität des Photons, Q^2 , die bestimmt, bis zu welchen Abständen ($1/Q^2$) Objekte im Proton aufgelöst werden können.

Betrachtet man nur das erste Glied von Gleichung 1.11, d.h. den Koeffizienten β_0, so hat α_s in führender Ordnung die Form

$$\alpha_s(Q^2) = \frac{4\pi}{\beta_0 \, \ln(Q^2/\Lambda^2_{QCD})}, \quad \beta_0 = (11 - \frac{2}{3}\,N_f). \qquad (1.12)$$

N_f bezeichnet dabei die Anzahl der Quark-Flavours mit einer Masse, die jeweils kleiner ist als die hier benutzte Renormierungsskala $\mu_R = Q^2$. Λ_{QCD} definiert die Stärke der Kopplung und zeigt auf, ab wann α_s so stark wird, daß die Störungstheorie nicht mehr anwendbar ist. Der Wert muß experimentell bestimmt werden und liegt in der Größenordnung von $\Lambda_{QCD} = 200$ MeV. Der derzeitige Weltmittelwert für α_s [Bet98] liegt bezogen auf die Masse des Z^0-Bosons bei

$$\alpha_s(M_Z) \;=\; 0.119 \pm 0.004 \qquad (1.13)$$

1.4.2 Faktorisierung

Eine fundamentale Eigenschaft der QCD ist die Möglichkeit, die Berechnung von Strukturfunktionen oder Wirkungsquerschnitten aufzuteilen in Beiträge von Prozessen, die bei kurzen Abständen ablaufen und von Prozessen größerer Reichweiten. Damit erhält man zwei voneinander entkoppelte Bereiche, wobei der Prozeß bei kurzen Distanzen mit genügend großem Transversalimpuls k_T störungstheoretisch berechenbar ist, der Prozeß bei großen Distanzen i.a. aber nicht.
Um die Strukturfunktion F_2 der tiefunelastischen Streuung zu extrahieren, beschäftigt man sich einerseits mit den Partonen mit hohem k_T am Photonvertex (harter Streuprozeß) und der unbekannten Prozesse im Proton, die in Graphik 1.1 durch den leeren Kreis darstellt sind. Dort können intern Gluonen abgestrahlt und wieder absorbiert werden. Alle Gluonemissionen unter kleinen Winkeln, d. h. parallel zum einlaufenden Quark, sind aber störungstheoretisch nicht berechenbar und führen zu kollinearen Divergenzen bei der Berechnung von F_2. Sie werden daher absorbiert in den Partondichtefunktionen (PDF), die ein Maß sind für die Wahrscheinlichkeit, ein Parton der Sorte $u, d, \bar{u}, \bar{d}, ..., g$ im Proton zu finden. Die Abhängigkeit der PDF von der Faktorisierungsskala (Bedeutung s.u.) wird durch die DGLAP-Entwicklungsgleichungen [AP77] beschrieben. Die PDF werden indirekt aus experimentellen Werten, z.B. der Messung von F_2 bestimmt. Dabei geht man von bestimmten Startverteilungen der PDF aus, deren Parameter unter der Berücksichtigung der Entwicklungsgleichungen an die Daten angepaßt werden.
Um die beschriebene Aufteilung verwirklichen zu können und damit eine Observable zu berechnen, führt man eine weitere Skala μ_F (Faktorisierungsskala) ein. Ihre Bedeutung ist graphisch dargestellt in Bild 1.3.



Abbildung 1.3: *Veranschaulichung der Faktorisierungsskala. μ_F teilt die Berechnung einer Observable in den Teil des harten Streuprozesses, der bei kurzen Distanzen (Zeiten Δt) stattfindet und den langreichweitigen Teil, der in der Partondichtefunktion absorbiert wird.*

Wie auch bei der Renormierung hängt der Wert einer physikalischen Observable F

nicht von der künstlich eingeführten Faktorisierungsskala ab. Es muß gelten

$$\frac{\partial\, F}{\partial \mu_F} = 0 \quad , \quad \frac{\partial\, F}{\partial \mu_R} = 0 \; . \tag{1.14}$$

Diese Forderung wird bei theoretischen Berechnungen nur dann vollständig erfüllt, wenn die Observable O durch eine komplette Störungreihe berechnet wurde. In der Praxis wird die Reihe nach wenigen Gliedern abgebrochen und ein Resteinfluß bleibt bestehen.
Es ist meist üblich, die Skalen gleichzusetzen:

$$\mu_R = \mu_F \; . \tag{1.15}$$

Im Bereich der tiefunelastischen Streuung ist sicherlich der Impulsübertrag Q^2 eine prozeßrelevante Skala und bietet sich prinzipiell als Wahl für μ_R und μ_F an. Bei der Beschreibung von Jetobservablen ist auch die transversale Energie der Jets charakteristisch für das Ereignis (s. Abschnitt 1.5) und kann daher ebenfalls als Skala verwendet werden.

1.4.3 Gluonabstrahlungen

Im Quark-Parton-Modell werden Gluonen als mögliche Partonen im Streuprozeß vernachlässigt. In der QCD jedoch werden sie mitberücksichtigt und Feynmangraphen, in denen eine oder mehere Gluonabstrahlungen vorkommen, berechnet. Die Terme innerhalb der Berechnung, die die Gluonabstrahlung beschreiben sind Korrekturen höherer Ordnung zum QPM. Gluonen können von Quarks oder Gluonen selber gemäß einer bestimmten Wahrscheinlichkeit abgestrahlt werden. Sie koppeln mit der Stärke α_s an das Parton, von dem sie ausgehen und können entweder vor oder nach dem harten Streuprozeß am Photon ausgesandt werden. Ein möglicher Prozeß der Ordnung $\mathcal{O}(\alpha_s)$, der QCD-Compton-Prozeß, ist in Bild 1.4 a) als Feynmandiagramm dargestellt.

Ebenfalls unter Beteiligung eines Gluons läuft der Prozeß der Boson-Gluon-Fusion ab, der in Abbildung 1.4 b) zu sehen ist. Hierbei ist das aus dem Proton einlaufende Parton ein Gluon, das in ein Quark-Antiquark-Paar fluktuiert, wo eines der Partonen am Photon streut. Bei diesen beiden Prozessen zählt man zwei Partonen im Endzustand, wenn man davon ausgeht, daß diese Partonen einen genügend hohen Impuls haben. Denn wenn z.B. im QCD-Compton-Prozeß das Gluon unter einem zu kleinen Winkel zum Quark ausgesandt wird, kann man es bei einer Messung des Endzustandes nicht mehr auflösen und als zweites Parton identifizieren. Eine kollineare Divergenz $(\theta \to 0)$ entsteht, wenn man so einen Feynmangraphen berechnen wollte. Man spricht von "harten" Partonen, wenn der Transversalimpuls groß genug ist. Ebenfalls problematisch ist der Fall, wenn das abgestrahlte Gluon zu wenig Energie hat und eine



Abbildung 1.4: *Feynmangraph für Prozesse in 1. Ordnung α_s: a) QCD-Compton-Prozeß, b) Boson-Gluon-Fusion, wo ein Gluon aus dem Proton in ein $q - \bar{q}$-Paar fluktuiert und eines dieser Partonen am Photon gestreut wird.*

sogenannte infrarote Divergenz ($E \to 0$) erzeugt wird.

Ob tatsächlich genügend transversale Energie erzeugt wurde, bzw. wieviele kollimierte Teilchenbündel, die "Jets", sich im Detektor nach der Hadronisierung (Kap. 2.1.3) identifizieren lassen, entscheidet ein Jetalgorithmus, der im nächsten Abschnitt beschrieben wird. Durch Anwendung des Algorithmus werden Divergenzen eliminiert, indem über den kritischen Bereich integriert wird.
Quarks und Gluonen sind nicht direkt meßbar, deshalb muß immer über die im Ereignis gemessenen Teilchen indirekt auf den zugrundeliegenden partonischen Prozeß geschlossen werden. So kann man auf jeder Bezugsebene von Jets reden, wie es in Graphik 1.5 (analog zu [Sey95]) dargestellt ist.

Die Jets, die man auf Detektor-, Hadron- oder Partonniveau findet, basieren alle auf demselben Feynmangraphen, der das Ereignis beschreibt. Der Übergang von den gemessenen Teilchen zu den Hadronen kann ohne große Probleme vollzogen werden. Mit Hilfe eines Monte Carlo-Programms kann aufgrund der genauen Kenntnis der Detektorantwort eine Korrektur der Daten auf Detektoreffekte vorgenommen werden. Der Übergang zwischen dem Hadron- und Partonniveau dagegen ist nicht so einfach zu vollziehen. Die Korrekturfunktion zwischen diesen Niveaus kann ebenfalls mit Hilfe von MC-Programmen abgeschätzt werden, sie ist stark modellabhängig.
Berechnet man einen Prozeß in führender Ordnung der Störungstheorie erhält man eine 1-zu-1-Korrelation zwischen Partonen und Jets. Bei der Messung kann man nur die Eigenschaft von Ereignissen, z.B. anhand von Jetgrößen studieren, die zwar von



Abbildung 1.5: *Darstellung der verschiedenen Niveaus einer Jetanalyse.*

einem Parton initiiert wurden, aber nicht das Parton selber sind. Bis heute ist der Übergang zu den Partonen nicht fundamental verstanden und kann nicht grundlegend berechnet werden.

Um höhere Jet-Multiplizitäten zu erzeugen, müssen in einer tiefunelastischen Streuung mehrere Partonen erzeugt werden. So findet ein 3-Jet-Ereignis mindestens zur Ordnung $\mathcal{O}(\alpha_s^2)$ statt. Ein Feynmangraph wie in Abb. 1.6 a) kann Grundlage eines 3-Jetereignisses sein, wenn die abgestrahlten Gluonen hart genug sind. Wird noch ein weiteres Gluon erzeugt, kann sogar ein Ereignis mit vier Jets entstehen, s. Abb. 1.6 b).

Multijetereignisse sind selten, da ihr Wirkungsquerschnitt proportional zur Potenz von α_s ist, die der Ordnung des Prozesses entspricht. So haben nur ca. 1/10 aller Ereignisse mit mindestens zwei Jets auch einen dritten Jet. Von denen kann widerum nur 1/10 mit Hilfe des Jetalgorithmus als 4-Jet-Ereignis klassifiziert werden.

1.5 Der Jet-Algorithmus

Um ein eng kollimiertes Teilchenbündel, einen sogenannten Jet, zu definieren und zu identifizieren, benötigt man einen wohldefinierten Algorithmus. Mit dessen Hilfe wer-



Abbildung 1.6: *a) zeigt einen Feynmangraphen mit drei Partonen im Endzustand, die als 3-Jetereignis gemessen werden können. Wird ein weiteres Gluon abgestrahlt wie in b), kann daraus sogar ein 4-Jetereignis entstehen, wenn das zuletzt abgestrahlte Gluon genügend transversalen Impuls mitbekommen hat und als weiterer Jet im Detektor aufgelöst werden kann.*

den alle “Teilchen“ eines Ereignisses sukzessiv zusammengefaßt. Damit bezieht man sich entweder auf gemessene Energiedepositionen im Detektor oder auf stabile Hadronen/Partonen aus einer Modellrechnung. Das gestreute Elektron ist davon immer ausgenommen.
Der Jetalgorithmus muß sicherstellen , daß die Meßgrößen infrarot und kollinear “sicher“ sind. Partonen, die mit zu kleinem Winkel oder zu kleiner Energie abgestrahlt werden, werden mit dem Mutterparton zusammengefaßt und treten nicht als divergente Terme der Integration auf.

In dieser Analyse wird der sogenannte “longitudinal invariante k_t -Algorithmus“ [ES93], [CDW93] benutzt.
Er wird im Breitsystem angewendet, das man durch eine Lorentztransformation in z-Richtung vom Proton-Photon-Ruhesystem aus (Photon-, Proton-Dreiervektor $\vec{\gamma}+\vec{p_P} = 0$) erreicht. Der Transformationsvektor ist $\vec{\gamma}+2x\vec{p_P} = 0$. Im Breitsystem ist das virtuelle Boson vollständig raumartig, sein Viererimpuls ist $p_\gamma = (0,0,0,p_z = -Q)$, so daß keine Energie übertragen wird. Im QPM entspricht die Kollision des Quarks mit dem Photon der Reflexion unter Impulserhaltung an einer Wand, nämlich dem ruhenden Boson. Die Photon-Quark-Kollision eines DIS-Ereignisses in 0. Ordnung α_s ist in Abbildung 1.7 illustriert. Da im Breitsystem der Transversalimpuls des Photons Null ist, werden alle auftretenden Transversalimpulse durch den QCD-Prozeß erzeugt.



Abbildung 1.7: *Darstellung der Photon-Quark-Kollision eines DIS-Ereignisses im Breitsystem ($\vec{\gamma} + 2x\vec{p} = 0$).*

Zur Charakterisierung der Teilchen in einem Ereignis wird die Pseudorapidität η verwendet. Sie wird definiert mit Hilfe des Streuwinkels θ des Teilchens, der gegen die Protonflugrichtung gemessen wird. (Vergleiche die Definition des H1-Koordinatensystems in Kapitel 3.2.)

$$\eta = -\ln\tan(\frac{\theta}{2}) \tag{1.16}$$

Der Jet-Algorithmus funktioniert nach folgendem Schema: Er verwendet die unter einer longitudinalen Lorentztransformation invarianten Größen wie die transversale Energie E_T, die Differenz zweier Pseudorapiditäten oder Azimuthalwinkel $\Delta\eta$, $\Delta\phi$.

1. Man startet mit einer Liste aller Teilchen im Ereignis und setzt die Anzahl der Jets auf Null.

2. Für alle Teilchen wird der Abstand d_{ij} untereinander und der Abstand zur Strahlachse d_i berechnet. Diese Werte berechnet man nach

$$\mathrm{d_i} = \mathrm{E_{T,i}^2}\ \mathrm{R_0^2}, \tag{1.17}$$

dabei wird $R_0^2 = 1$ gesetzt, und

$$\mathrm{d_{ij}} = \min(\mathrm{E_{T,i}^2}, \mathrm{E_{T,j}^2})\ \mathrm{R_{ij}^2} \quad \text{mit} \quad \mathrm{R_{ij}^2} = \Delta\eta_{\mathrm{ij}}^2 + \Delta\phi_{\mathrm{ij}}^2. \tag{1.18}$$

Hierbei ist $E_{T,i}$ die transversale Energie des Teilchens i.

3. Danach bestimmt man den kleinsten Abstand d_{min} aus allen d_i und d_{ij}.

4. Falls d_{min} aus der Menge der d_{ij} ist, faßt man die Teilchen i,j zu einem neuen Teilchen zusammen, das in der Liste auftaucht. Die Ausgangsteilchen i,j werden

aus der Liste gestrichen. Die Addition der beteiligten Teilchen geschieht nach einem ausgwählten Rekombinationsschema. In diesem Fall wird das sogenannte "E_T-Schema" (Snow Mass Convention [Hut90]) benutzt, das vorschreibt, wie E_T, η und Φ z.B. der Teilchen 1 und 2 zusammengefaßt wird.

$$\mathrm{E_T} = \sum_{\mathrm{i}=1,2} \mathrm{E_{T,i}} \; , \qquad \eta = \frac{1}{\mathrm{E_T}} \sum_{\mathrm{i}=1,2} \mathrm{E_{T,i}} \eta_\mathrm{i} \; , \qquad \phi = \frac{1}{\mathrm{E_T}} \sum_{\mathrm{i}=1,2} \mathrm{E_{T,i}} \phi_\mathrm{i} \tag{1.19}$$

5. Ist d_{min} aus der Menge der d_i, so hat man einen Jet gefunden, der in der Jetliste gespeichert wird.

6. Diese Prozedur wird solange iteriert, bis es nur noch Jets und keine Teilchen mehr gibt.

Wenn man im Folgenden von der Position eines Jets redet, meint man dessen Achse. Diese ist definiert durch die Summe aller Teilchen i, die dem Jet zugeordnet sind. Man kann die transversale Energie, die Pseudorapidität und den Azimutalwinkel eines Jets bestimmen durch

$$\mathrm{E_{T,jet}} = \sum_{\mathrm{i}} \mathrm{E_{T,i}} \; , \qquad \eta_\mathrm{jet} = \frac{\sum_\mathrm{i} \mathrm{E_{T,i}} \; \eta_\mathrm{i}}{\sum_\mathrm{i} \mathrm{E_{T,i}}} \; , \qquad \phi_\mathrm{jet} = \frac{\sum_\mathrm{i} \mathrm{E_{T,i}} \; \phi_\mathrm{i}}{\sum_\mathrm{i} \mathrm{E_{T,i}}} . \tag{1.20}$$

Die so definierten Jets des $\mathrm{k_t}$-Algorithmus sind masselos. Die Komponenten des Vierervektor eines Jets $\mathrm{P_{jet}} = (\mathrm{E_{jet}}, \mathrm{p_{x,jet}}, \mathrm{p_{y,jet}}, \mathrm{p_{z,jet}}) = (\mathrm{E_{jet}}, \vec{\mathrm{p}}_\mathrm{jet})$ werden berechnet aus den folgenden Zusammenhängen:

$$\mathrm{E_{jet}} = \mathrm{E_{T,jet}} \cdot \cosh \eta_\mathrm{jet} \; , \tag{1.21}$$

$$\mathrm{p_{x,jet}} = \mathrm{E_{T,jet}} \cdot \cos \phi_\mathrm{jet} \; , \quad \mathrm{p_{y,jet}} = \mathrm{E_{T,jet}} \cdot \sin \phi_\mathrm{jet} \; , \quad \mathrm{p_{z,jet}} = \mathrm{E_{T,jet}} \cdot \sinh \eta_\mathrm{jet} \tag{1.22}$$

Kapitel 2

Monte Carlo-Modelle und QCD-Vorhersagen

Für das Verständnis der physikalischen Prozesse ist der Vergleich der gemessenen Daten mit theoretischen Rechnungen unerläßlich. Diese Vorhersagen werden durch die Implementierung in Monte Carlo-Programmen zugänglich gemacht. Für den Vergleich der gemessenen 3-Jet-Wirkungsquerschnitte werden Ereignisgeneratoren unterschiedlicher Art herangezogen. Zum einen gibt es die Gruppe der allgemeinen Monte Carlo-Generatoren wie RAPGAP und ARIADNE, die den vollständigen hadronischen Endzustand erzeugen. Sie werden dazu verwendet mit Hilfe der Simulation des H1-Detektors gemessene Daten auf Detektoreffekte zu korrigieren. Diese Daten können dann direkt mit den Modellvorhersagen verglichen (Abschnitt 5.6). Andererseits wird mit Programmen verglichen, die die QCD-Rechnungen zu einem ganz bestimmten Prozeß liefern und eine viel eingeschränktere Funktionalität haben als die allgemeinen Monte Carlo-Generatoren, wie z.B das Programm DISENT. Sie liefern QCD-Prozesse bis zu einer bestimmten Ordnung in α_s und sind nicht auf die Näherungen angewiesen, die in allgemeinen Monte Carlo-Generatoren gemacht werden. Im Folgenden wird der Begriff "Monte Carlo-Generator" nur auf die im Abschnitt 2.1 besprochenen Programme wie RAPGAP angewendet.

Eine Übersicht der Funktionsweise von DISENT und die theoretischen Grundlagen, mit denen die QCD-Rechnungen durchgeführt wurden, findet man in Kapitel 2.2.

2.1 Monte Carlo-Modelle

Die verwendeten Monte Carlo-Generatoren simulieren Ereignisse, die bei HERA in der e-p-Streuung erzeugt werden können. Die Verwendung von Generatoren [Sjö95] und

somit die Annäherung der Realität durch ein Modell wird mit theoretischen und experimentellen Argumenten gerechtfertigt. In einem Ereignisgenerator wird die komplexe Vielteilchenphysik in vielen kleinen Schritten behandelt. Dabei ist das Spektrum der vom Programm bereitgestellten physikalischen Größen, die studiert werden können, viel breiter und flexibler, als man mit einer analytischen Rechnung abdecken könnte, da der detaillierte Endzustand eines Ereignisses zur Verfügung gestellt wird. Ein Generator wird von experimenteller Seite aus dazu verwendet, die Durchführbarkeit einer geplanten Analyse zu testen, Ereignisraten und -topologien zu simulieren und den Untergrund abzuschätzen. Weiterhin spielt die genaue Kenntnis eines simulierten Endzustandes eine große Rolle bei Studien zum Verständnis des Detektors. So lassen sich mit Hilfe von Monte-Carlo-Vorhersagen die Daten auf Detektoreffekte, wie zum Beispiel Verluste aufgrund einer eingeschränkten Detektorakzeptanz, korrigieren. Die Messungen sind damit unabhängig vom einzelnen Experiment und universell vergleichbar.
Eine solche Ereignissimulation läßt sich in folgende Schritte unterteilen: Zuerst wird der Wirkungsquerschnitt der Reaktion berechnet und der elementare Streuprozeß generiert. Anschließend werden durch einen im Modell beschriebenen Mechanismus weitere Partonen erzeugt, bis anschließend alle Partonen in die Phase der Hadronisierung eintreten. Diese beschreibt den Übergang von Gluonen und Quarks in die im Detektor meßbaren Teilchen des hadronischen Endzustandes. Es findet also eine Zweiteilung statt zwischen der Erzeugung aller Partonen des Ereignisses und deren Hadronisierung.

2.1.1 RAPGAP und LEPTO

Die Ereignisgeneratoren RAPGAP [Jun95] und LEPTO [Ing91] sind Programme zur vollständigen Simulation von tiefunelastischen Streuereignissen bei HERA.
Zu Beginn der Simulation werden die unabhängigen kinematischen Variablen per Zufallsgenerator erzeugt. Zunächst wird durch eine numerische Integration über die kinematischen Variablen der totale Wirkungsquerschnitt berechnet. Anschließend wird ein Punkt des zugänglichen Phasenraumes mit der Wahrscheinlichkeit $\frac{d^2\sigma}{dxdQ^2}/\sigma_{tot}$ ausgewählt. Die kinematischen Variablen des Ereignisses werden gewürfelt und alle Partonen erzeugt.

Matrix-Element und Partonschauer

RAPGAP ist ein Generator, der nach dem Schema "Matrixelement + Partonschauer" (ME+PS) arbeitet. Das bedeutet, daß die Erzeugung der Partonen eines Ereignisses zur n-ten Ordung α_s in zwei Schritte unterteilt wird. Mit dem Matrix-Element (ME) wird



Abbildung 2.1: *Schematische Darstellung der Simulation tiefunelastischer Ereignisse durch RAPGAP. Das Ereignis ist aufgeteilt in die Berechnung des Matrix-Elementes am Photonvertex, dem harten Subprozeß und dem Partonschauer, der im Anfangs- und Endzustand auftreten kann. Anschließend gehen alle Partonen in die Phase der Hadronisierung über.*

die erste Ordnung in α_s exakt berechnet. Die höheren Ordnungen werden näherungweise durch die Emission von Partonen im Anfangs- und Endzustand, den Partonschauer (PS), eingebunden.
Die Berechnung des Partonschauers basiert auf den Altarelli-Parisi-Entwicklungsglei–chungen [AP77] und geschieht in der sogenannten "Leading Logarithmic Approximation" (LLA), in der die höheren Ordnungen in α_s, d. h. Terme $\sim (\alpha_s \log \frac{Q^2}{Q_0^2})^n$, aufsummiert werden. Der Partonschauer wird aufgeteilt in die Gluonabstrahlungen vor und nach dem Photonvertex. Beim Partonschauer im Anfangszustand ("initial state parton shower", ISPS) erhält das einlaufende Parton eine wachsende raumartige Virtualität ($m_q^2 < 0$) durch die Abstrahlung von zeitartigen ($m^2 > 0$) Gluonen. Das Maximum der Virtualität ist am Photon-Vertex erreicht und entspricht dem Impulsübertrag Q^2. Im Partonschauer des Endzustandes ("final state parton shower", FSPS) werden weitere Gluonen mit abnehmender zeitartiger Virtualität emittiert. Dabei werden die Öffnungswinkel der Verzweigungen so gewählt, daß sie zunehmend kleiner werden. Interferenzterme zwischen Gluonen der beiden Partonschauerteile werden in diesem Modell vernachlässigt.
Alle so erzeugten Partonen werden dem Programm JETSET (s. Kap. 2.1.3) übergeben, das den Prozeß der Hadronisierung vollzieht, wie in Punkt 2.1.3 beschrieben. Die

einzelnen Phasen der Simulation sind schematisch in Abbildung 2.1 dargestellt.

3-Parton-Phasenraum

Zum besseren Verständnis der 3-Jet-Daten ist es nötig, den zugrundeliegenden Phasenraum der Meßgrößen zu studieren. Dazu werden Konfigurationen mit drei Partonen erzeugt, die homogen über den verfügbaren Phasenraum verteilt sind (d.h. ein konstantes Matrix-Element haben). Der Prozeß $\gamma\ g \rightarrow\ q\ \bar{q}\ g$ wird mit einer modifizierten Version von RAPGAP generiert (v. 2.07/03) und kann mit dem Parameter IPRO = 99 aktiviert werden. Dieser Prozeß läuft unter der Annahme ab, daß ein Gluon mit einem Impuls aus dem Proton kommt, der der x-Verteilung der Gluondichte entspricht, die in RAPGAP gewählt wurde. Die Impulse der drei erzeugten Partonen werden entsprechend dem Phasenraum der Masse des Photon-Gluon-Systems generiert. Ihre invariante Masse wird also aus dem Viererimpuls des Gluons und Photons berechnet. Die Verteilung der invarianten Masse wird anschließend gemäß der gemessenen invarianten 3-Jet-Masse (s. Kap. 5) umgewichtet, um diese reproduzieren zu können. So kann der Phasenraum für die drei Partonen entsprechend den bei HERA gemessenen Jets generiert werden. Wahlweise können Partonschauer im Anfangs- und Endzustand hinzugefügt werden. Der Phasenraumgenerator wird für die Vergleiche in dieser Analyse ohne Partonschauer und anschließende Hadronisierung verwendet.

2.1.2 ARIADNE

ARIADNE [Lön92] erzeugt nur die Partonkaskade eines Ereignisses und wird daher mit weiteren Programmen in Verbindung gebracht, um als vollständiger Monte Carlo-Generator zu arbeiten. Dabei geneneriert LEPTO [Ing91] die kinematischen Variablen x_{Bj} und Q^2 des Ereignisses gemäß dem elektroschwachen Wirkungsquerschnitt in analoger Weise wie RAPGAP. Weiterhin wird die Hadronisierung ebenfalls durch JETSET vollzogen.
In ARIADNE wird die Erzeugung der QCD-Kaskade nach dem Farbdipol-Modell vollzogen. In diesem Modell werden Gluonen von Dipolen abgestrahlt, die aus zwei farbig geladenen Partonen bestehen. Das Matrix-Element wird in erster Ordung α_s berechnet.

Das Farbdipol-Modell

Das Farbdipol-Modell (colour dipole model, CDM) wurde ursprünglich entwickelt für Partonkaskaden in der e^+e^- -Annihilation und basiert auf der Annahme, daß die Gluonemission von einem $q\bar{q}$-Paar als Abstrahlung eines Farbdipols beschrieben werden



Abbildung 2.2: *Feynmangraphen zur Dipolemission in ARIADNE: Erzeugung von $q\bar{q}gg$ im Endzustand*

kann, der zwischen dem jeweils farbgeladenen Quark und Antiquark gebildet wird. Die Emission weiterer Gluonen kann in guter Näherung als Strahlung von einem der entstandenen unabhängigen Dipole ($q - g$ oder $g - \bar{q}$) angenommen werden und ist in Bild 2.2 illustriert. Das Modell wurde für die e-p-Streuung erweitert. In der tiefunelastischen Streuung besteht der emittierende Dipol nicht mehr aus dem punktförmigen Quark und Antiquark, sondern aus dem gestreuten Quark und dem Protonrest, der als ausgedehntes Objekt angenommen wird.
Eine ausführliche Erläuterung des Farbdipol-Modells und seiner Parameter befindet sich in [Moh97], basierend auf den theoretischen Veröffentlichungen von [GP88, AG88, AG91, AG93].
Dies Standardversion von ARIADNE wird bei den Vergleichen mit unkorrigierten Daten in Kapitel 6 mit DJANGO.CDM. bezeichnet. In Kapitel 7 wird mit korrigierten Daten verglichen, so daß man nicht mehr auf die Verwendung von DJANGO und der Detektorsimulation angewiesen ist. Daher tragen die Vorhersagen dort die Bezeichnung CDM.

Die Version mit einem neuen Parametersatz

Es gibt in ARIADNE Parameter, deren Wert nicht a priori festgelegt ist, sondern an Messungen angepaßt werden muß. In dieser Arbeit wird zum Vergleich mit Jetdaten eine Version mit einem veränderten Parametersatz benutzt, die für die Beschreibung der Transversalimpulsverteilung von 2-Jet-Ereignissen bei HERA optimiert worden ist. Dazu wurden folgende Parameter (s. ARIADNE Manual) gesetzt:

PARA(10)=1.6 , PARA(25)=1.6 , PARA(27)=0.75.
Diese Version mit dem optimierten Parametersatz wird bei den Vergleichen mit unkorrigierten Daten (Kapitel 6) mit DJ.CDM.T genannt. Beim Vergleich mit korrigierten Daten (Kapitel 7) trägt sie die Bezeichnung CDM.T.

2.1.3 JETSET

JETSET [Sjö94] stellt die notwendige Ergänzung zu den Generatoren RAPGAP und ARIADNE dar. Mit diesem Programm wird der Übergang der Partonen in Hadronen, die sogenannte Hadronisierung, und der anschließende Zerfall kurzlebiger Teilchen realisiert.
Unter dem Begriff der Hadronisierung wird die Summe aller störungstheoretisch nicht berechenbaren Prozesse verstanden, die zur Bildung von Hadronen führen. Der Übergang findet bei einer niedrigen Energieskala statt, bei der die Virtualität der Partonen klein geworden ist ($m^2 \approx 1\text{GeV}^2$). Die Faktorisierung von elementarem Streuprozeß und nachfolgenden nicht-perturbativen Prozessen erlaubt eine getrennte Behandlung in unabhängig einsetzbaren Monte Carlo-Programmen. Die Hadronisierung wird durch phänomenologische Konzepte modelliert. Alle Ansätze dieser Art müssen dem Grundsatz des Quarkeinschlusses ("confinement") Rechenschaft tragen und sicherstellen, daß die Quarks und Gluonen einen Umwandlungsprozeß zu beobachtbaren, farbneutalen Teilchen hin durchlaufen. JETSET vollzieht diesen Übergang nach dem "Lund-String-Modell".

Das Lund-String-Modell

Das Lund-String-Modell [AGIT83], [AGS83],[Sjö94] läßt sich am einfachsten am Prozeß $e^+ \; e^- \;\rightarrow\;\; q\; \bar{q}$ erklären. Nach der Erzeugung des Quark und Antiquarks entfernen sich die Teilchen in entgegengesetzter Richtung in dem zwischen ihnen herrschenden Farbfeld voneinander. Die Feldlinien des Farbfeldes, die vom Quark zum Antiquark laufen, bilden einen dreidimsionalen Flußschlauch von ca. 1 fm Durchmesser, genannt "String". Ein String trägt eine gleichmäßige Energiedichte (Energie pro Längeneinheit) Wenn der relative Abstand des auseinanderlaufenden $q\bar{q}$-Paares groß wird, d.h. die typische Größenordnung von 1 fm übersteigt, ist es energetisch günstiger, daß sich der Flußschlauch auftrennt und in seinem Zwischenbereich ein neues q$\bar{\text{q}}$-Paar gebildet wird. Dieser Prozeß kann sich mehrfach wiederholen, so daß der ursprüngliche String in viele Teile aufgespalten wird. Anschließend werden die Paare zu farbneutralen Mesonen und Baryonen zusammengefaßt. Der Prozeß ist in Abbildung 2.3 illustriert.



Abbildung 2.3: *Schematische Darstellung der Fragmentation nach dem Lund-String-Modell: Der zwischen dem* q$\bar{\text{q}}$*-Paar gespannte String (gewellte Linie) bricht sukzessive, unter der Erzeugung weiterer $q\bar{q}$-Paare, auf. Im Endzustand werden Mesonen und Baryonen beobachtet.*

2.1.4 DJANGO

Der Generator DJANGO [CSS94] ist in der Lage, Ereignisse zu generieren, die im Endzustand ein zusätzliches reelles Photon aufweisen, das vom Elektron abgestrahlt wurde ($eq \to eq\gamma$). Man spricht dann von einem radiativen Ereignis. Die Photonabstrahlung kann entweder vor oder nach der Wechselwirkung des Elektrons mit dem Proton geschehen, wie in Abb. 2.4 dargestellt ist. Dieser Effekt wird durch die Quantenelektrodynamik (QED) beschrieben und in ihrem Rahmen berechnet. DJANGO wird in Verbindung mit den Programmen HERACLES, ARIADNE und JETSET verwendet. Dabei werden in HERACLES tiefunelastische Ereignisse simuliert, die elektromagnetische Korrekturen zur Ordnung α einschließen. Es wird ein Matrix-Element der Ordnung $\mathcal{O}(\alpha\alpha_s)$ berechnet und QCD-Effekte höherer Ordnung durch das Farbdipol-Modell von ARIADNE erzeugt.
Simulierte und rekonstruierte Monte Carlo-Ereignisse aus DJANGO werden für die Korrektur der Daten auf Detektor- und QED-Strahlungseffekte verwendet.



Abbildung 2.4: *Berücksichtigung der radiativen Korrekturen zur e-p-Streuung: das Elektron kann vor oder nach der Streuung am Quark ein Photon aussenden, wie in b) bzw. a) dargestellt ist. Solche Ereignisse werden vom Monte Carlo-Generator DJANGO erzeugt und zur Korrektur der Daten auf radiative Effekte verwendet*

2.1.5 PHOJET

Das Programm PHOJET [Eng95, ER96] wird dazu verwendet, den Untergrund an Photoproduktionsereignissen, also den Streuprozeß zwischen nahezu reellen Photonen und dem Proton, in der Analyse abzuschätzen. Es simuliert alle Anteile, die zum totalen Wirkungsquerschnitt für Photoproduktion in e-p-Streuung gehören. Der Fluß der quasireellen Photonen ($Q^2 \approx 0$) wird generiert mit IJRAY [Abt93]. Zur Berechnung der Prozesse wird sowohl die Regge-Phänomenologie als auch die störungstheoretische QCD herangezogen. Eine detaillierte Beschreibung findet man in [Erd96]. Die Hadronisierung findet ebenfalls nach dem Lund-String-Modell in JETSET statt.

2.2 QCD-Rechnungen

Der Fortschritt im Verständnis der Physik der starken Wechselwirkung ist weitgehend auf den Vergleich von präzisen experimentellen Daten mit sehr genauen QCD-Rechnungen in höheren Ordnungen der Störungstheorie zurückzuführen. Die Grundlage der Berechnung von Wirkungsquerschnitten bildet das Quark-Parton-Modell. Die Faktorisierung der Rechnung in eine Faltung aus nicht-störungstheoretisch behandelbarer Partondichtefunktion (PDF) mit einem Matrixelement $\mathcal{M}$, das den harten Subprozess beschreibt, wird ausgenutzt. Die PDF ist universell, d.h. prozeßunabhängig und muß nicht für jede neue Observable F neu berechnet werden.
Die Berechnung eines Wirkungsquerschnittes in der führenden Ordnung des Prozesses

mit Hilfe der Störungstheorie leistet nur eine Vorhersage der Größenordnung und charakterisiert die ungefähren Eigenschaften von F. Die Genauigkeit der QCD-Störungsreihe wird kontrolliert durch die Beiträge der nächsthöheren Ordnung. Jede Berechnung sollte daher mindestens bis zur prozeßabhängigen nächstführenden Ordnung durchgeführt werden. Die starke Kopplungskonstante, sowie eine verwendete PDF muß entsprechend in derselben Ordnung verwendet werden.
Die Berechnung der nächstführenden Ordnung stößt auf grundlegende Probleme und ist prinzipiell erst seit wenigen Jahren überhaupt durchführbar. Dies liegt an der Struktur des Wirkungsquerschnittes in QCD-Rechnungen jenseits des QPM und der in den berechneten Beiträgen auftauchenden Divergenzen. Der folgende Abschnitt soll eine kurze Übersicht vermitteln über den Aufbau und die Berechnungsweise von Wirkungsquerschnitten in höheren Ordnungen der Störungstheorie. Die theoretischen Grundlagen befinden sich in [CS96a, CS97, CS96b].

2.2.1 Struktur des Wirkungsquerschnitts

Jeder partonische QCD-Wirkungsquerschnitt besteht aus zwei Teilen, wenn man neben dem grundlegenden Prozeß auch die erste Korrektur höherer Ordnung der Störungsreihe berücksichten will:

$$\sigma \;=\; \sigma^{LO} \quad + \quad \sigma^{NLO}. \tag{2.1}$$

Dabei bezeichnet LO (leading order) die führende, d.h. die erste nicht triviale Ordnung des Prozesses und NLO (next to leading order) die nächsthöhere Ordnung der Entwicklung. Diese Zuordnung ist allgemein anwendbar und nicht zu verwechseln mit der im Sprachgebrauch oft verwendeten aber irreführenden Bezeichnung LO = Ordnung α_s^0 und NLO = Ordnung α_s^1. Ein 3-Jet-Ereignis wird auf Partonniveau mit mindestens drei Partonen (m=3) im Endzustand erzeugt, die führende Ordnung des Prozesses ist hier $\mathcal{O}(\alpha_s^2)$ und die zu berücksichtigtenden Korrekturen der nächsten Ordnung NLO gehören zur $\mathcal{O}(\alpha_s^3)$. Allgemein ist der LO-Wirkungsquerschnitt das Integral über den Born-Wirkungsquerschnitt σ^B im m-parton Phasenraum $d\Omega^m$

$$\sigma \;=\; \int_m d\sigma^B. \tag{2.2}$$

Der Born-Wirkungsquerschnitt kann für einen Prozeß mit m Partonen und deren Impulsen p_k mit $k = 1, ..., m$ bzgl. der physikalischen Meßgröße F^m symbolisch geschrieben werden als

$$d\sigma^B \;=\; |\mathcal{M}_m(p_k)|^2 \cdot F^m(p_k) d\Omega^m(p_k) \quad . \tag{2.3}$$

Die Observable F^m, die innerhalb bestimmter experimenteller Akzeptanzschnitte berechnet werden kann, muß in ihrem Wert unabängig sein von den im Endzustand

möglicherweise auftretenden weichen oder kollinearen Gluonen (s. Kap 1.4.3). Ist diese Bedingung erfüllt, hat F^m die Eigenschaft infrarot ($E \to 0$) und kollinear ($\theta \to 0$) "sicher" zu sein. Die Integration von $d\sigma^B$ stellt kein prinzipielles Problem dar und wird meist numerisch mit Monte Carlo-Methoden vollzogen.
Der Beitrag σ^{NLO} macht die Rechnung erst kompliziert. Er besteht aus dem reellen Wirkungsquerschnitt σ^R des (m+1)-Parton-Endzustandes und den virtuellen Ein-Schleifenkorrekturen (1-loop) des m-Parton-Prozesses. Es ist

$$\sigma^{NLO} = \int_{m+1} d\sigma^R + \int_m d\sigma^V_{1-loop} \quad , \tag{2.4}$$

mit den expliziten Ausdrücken

$$\int_{m+1} d\sigma^R = \int_{m+1} |\mathcal{M}_{m+1}|^2 \cdot F^{m+1} d\Omega^{m+1} \tag{2.5}$$

$$\int_m d\sigma^V_{1-loop} = \int_m |\mathcal{M}^{1-loop}_m|^2 \cdot F^m d\Omega^m \tag{2.6}$$

Die beiden Integrale sind einzeln divergent, obwohl ihre Summe endlich ist. Der virtuelle Teil führt zu den drei bekannten Arten von Divergenzen ultraviolett, infrarot, kollinear, wobei die erstere durch das Verfahren der Renormierung (Abschnitt 1.4.1) behoben werden. Die Integration des reellen Wirkungsquerschnittes beinhaltet infrarote und kollineare Divergenzen, die sich nicht innerhalb des einzelnen Integrals aufheben. Ein mathematisches Verfahren, um die Divergenzen besser handhaben zu können, ist die dimensionale Regularisierung, bei der die Raum-Zeit-Dimension des Integrals von 4 minimal herabgesetzt wird auf $d = 4 - 2\epsilon$. Damit erscheinen die Divergenzen nach der Integration in Polstellen der Form $1/\epsilon$ und $1/\epsilon^2$. Wenn man nun den virtuellen und reellen Teil addiert, heben sich die Polstellen auf. Um zur ursprünglichen Integrationsdimension zurückzukehren, kann der Grenzübergang $\epsilon \to 0$ gefahrlos vollzogen werden und das Ergebnis ist ein endlicher, physikalischer Wirkungsquerschnitt. Im Prinzip gibt es also kein Problem mehr, nur in der Praxis ist dieses Konzept nicht so einfach zu realisieren. Da meist ein Multi-Parton-Zustand in einem durch Schnitte verkomplizierten Phasenraum behandelt werden soll, ist an eine analytische Integration nicht möglich. Auch numerische Methoden scheitern, wenn man $d\sigma^R$ und $d\sigma^V$ einzeln über verschiedene Parton-Phasenräume integrieren will. Eine Lösung dieses technischen Problems ist die Modifikation der Integranden mit der Subtraktions-Methode, die im Folgenden erläutert wird.

2.2.2 Die Subtraktions-Methode

Die prinzipielle Idee dieser Methode besteht darin, zu dem Wirkungsquerschnitt 2.4 einen Term σ^A zu addieren, wieder abzuziehen und den Ausdruck in gewünschter Weise zusammenzufassen:

$$\sigma^{NLO} = \int_{m+1} (d\sigma^R - d\sigma^A) + \int_m d\sigma^A + d\sigma^V_{1-loop} \quad , \tag{2.7}$$

Der Beitrag $d\sigma^A$ muß zwei wesentliche Eigenschaften besitzen:

- Er soll eine Abschätzung von $d\sigma^R$ sein und somit dasselbe punktweise singuläre Verhalten aufweisen, denn damit werden die Divergenzen innerhalb der Klammer von 2.7 aufgehoben und der Teil

  $$\sigma^{NLO(m+1)} = \int_{m+1} \left((d\sigma^R)_{\epsilon=0} - (d\sigma^A)_{\epsilon=0} \right) \tag{2.8}$$

  kann nach dem Grenzübergang von ϵ numerisch integriert werden.

- Weiterhin soll $d\sigma^A$ analytisch integrierbar sein und eine Integration über den 1-Parton-Phasenraum $\int_1 d\sigma^A$ genau die ϵ-Pole erzeugen, die sich mit denen des virtuellen Teils aufheben. Somit kann auch der Wirkungsquerschnitt, der die m-Parton-Kinematik enthält, numerisch integriert werden.

  $$\sigma^{NLO(m)} = \int_m \left(d\sigma^V_{1-loop} + \int_1 d\sigma^A \right)_{\epsilon=0} \tag{2.9}$$

Die endgültige Struktur des NLO-Wirkungsquerschnittes

$$\sigma^{NLO} = \sigma^{NLO(m)} + \sigma^{NLO(m+1)} \tag{2.10}$$

mit der Unterteilung in den m- und (m+1)-Partonraum macht die Implementierung der Integration in Monte Carlo-Programme einfach, da gewichtete Ereignisse mit m- und (m+1)-Partonen erzeugt und in Histogrammen aufaddiert werden können.

2.2.3 DISENT

Das Programm DISENT [CS97] berechnet infrarot und kollinear sichere Observablen für Ein- und Zwei-Jet-Ereignisse mit der jeweiligen NLO-Korrektur. Dabei benutzt es die Subtraktions-Methode aber in der Erweiterung des "Dipol-Formalismus" von Catani und Seymour. Dieser Algorithmus stellt eine Verallgemeinerung der Subtraktions-Methode dar, indem eine allgemeine Definition für die Form von $d\sigma^A$ gegeben wird (Details s. [CS97]), damit der Formalismus für jeden Prozeß anwendbar ist.
Bei der Berechnung von Observablen für Drei-Jet-Ereignisse muß man sich im Moment prinzipiell mit der Berechnung der führender Ordnung begnügen. Denn es ist noch

nicht möglich Wirkungsquerschnitte für vier Partonen im Endzustand zu berechnen, die den reellen Anteil des zugehörigen NLO-Wirkungsquerschnittes darstellen (s. Gl 2.4). DISENT wird hier verwendet, um die Daten mit einer QCD-Rechnung in führender Ordnung bzgl. Drei-Jet-Ereignissen zu vergleichen.

In DISENT wird für die Vergleiche mit den Daten die mittlere transversale Energie als Renormierungskala verwendet, da diese Skala charakteristisch für Multijetprozesse ist. Variiert man diese Skala zwischen $\mu_R = \frac{1}{2}\ \overline{E}_{T,Breit}$ und $\mu_R = 2\ \overline{E}_{T,Breit}$ ändert sich das absolute Niveau der DISENT-Vorhersage, aber nicht die Form der Kurve. Die Variation ist im Kapitel 6 gezeigt. Ein ähnliches Verhalten der DISENT-Vorhersage findet man bei der Berechnung von 2-Jet-Ereignissen in führender Ordnung [Wob99]. Die Wahl der Faktorisierungsskala hat so gut wie keinen Einfluß auf das Ergebnis. Auf die gememessenen Wirkungsquerschnitte hat der Wechsel von der E_T^2-Skala zur Q^2-Skala eine Auswirkung von weniger als 1%. Die Verteilungen der Variablen des 3-Jet-Schwerpunktsystems reagieren mit einem Unterschied von bis zu 2% in einzelnen Intervallen bei einem Wechsel der Skalen. Variiert man die Faktorisierungsskala zwischen E_T^2=25 GeV^2 und E_T^2=1000 GeV^2 , findet man ebenfalls keine Veränderung der Beschreibung.

Kapitel 3

Der H1-Detektor am Speicherring HERA

Die Hadron-Elektron-Ring-Anlage HERA ist der weltweit einzige Speicherring, in dem Elektronen (Positronen) und Protonen zur Kollision gebracht werden. An einer der vier Wechselwirkungszonen befindet sich der H1-Detektor, mit dem die in einer e-p-Streuung erzeugten Teilchen nachgewiesen werden. Dieses Kapitel soll einen Überblick über den Beschleuniger und das H1-Experiment geben.

3.1 Der Speicherring HERA

Der Speicherring HERA bei DESY (Deutsches Elektronen Synchrotron) in Hamburg wurde 1992 in Betrieb genommen und besteht aus einem Doppelringsystem mit einem Umfang von 6,3 km in einer Tiefe von 10-30 m unter der Erdoberfläche. Protonen werden auf 820 GeV beschleunigt und mit Hilfe von supraleitenden Dipolmagneten auf der gekrümmten Bahn gehalten. Aufgrund der relativ hohen Masse der Protonen ($m_p \approx 2000 \cdot m_e$) müssen dazu sehr hohe Feldstärken von 4.7 Tesla erreicht werden. Die Leptonen, die eine Energie von 27.5 GeV erreichen, können dagegen mit konventionellen Magneten und entsprechend geringeren Feldstärken auf die Kreisbahn gezwungen werden. Ihre maximale Energie ist durch den Energieverlust durch Synchrotronstrahlung begrenzt, der immer auftritt, wenn geladene Teilchen sich auf einer gekrümmten Bahn bewegen. Dabei gilt, je kleiner die Masse, umso größer ist der Verlust.

HERA wird durch sieben Vorbeschleuniger gespeist, die schematisch in Abbildung 3.1 dargestellt sind. Die Schwerpunktsenergie des e-p-Systems beträgt 300 GeV. Die Erzeugung der Proton- und Elektron-Teilchenstrahlen wird im Folgenden kurz dargestellt.



Abbildung 3.1: *Schematischer Überblick des HERA-Ringes mit den zugehörigen Vorbeschleunigeranlagen (s. Text)*

Für die Gewinnung von Protonen werden als erstes H^--Ionen in Paketen gebündelt, in den dafür vorgesehenen Linearbeschleuniger (H^--Linac) eingespeist, auf 50 MeV beschleunigt und in das Synchrotron DESY III überführt. Bei dieser Injektion durchqueren die H^--Ionen eine dünne Aluminiumfolie, an der sie die Elektronen abstreifen. Die so übrigbleibenden Protonen werden auf 7.5 GeV beschleunigt. Im Speicherring PETRA (Positron-Elektron-Tandem-Ringanlage) erhalten sie eine Energie von 40 GeV und werden anschließend in HERA eingeleitet, wo sie auf ihre Endenergie beschleunigt werden.
Die Elektronen stammen aus der Glühemission einer Wolframkathode, werden mit Hilfe eines elektrischen Feldes abgesaugt und danach im Vorbeschleuniger DESY II auf 9 GeV beschleunigt. Anschließend wird ihre Energie in PETRA auf 12 GeV erhöht, und sie können anschließend in HERA injiziert werden. Da die Teilchenstrahlen in HERA durch hochfrequente elektromagnetische Wechselfelder beschleunigt werden, ergibt sich kein kontinuierlicher Strahl, sondern eine Paketstruktur, die im Ring umläuft. Die Strahlen im gesamten HERA-Umfang sind unterteilt in 210 Pakete mit einem zeitlichen Abstand von 96 ns, woraus sich eine Wechselwirkungsrate von 10.4 MHz an den Experimenten ergibt. Jedes Paket besteht aus ungefähr 10^{10} Teilchen, die zur Kollision gebracht werden. Die longitudinale Ausdehnung eines Protonenpaketes beträgt ca. 60 cm. Die Elektronen sind im Vergleich fast punktförmig kollimiert.

Die wichtigste Kenngröße eines Beschleunigers ist dessen Luminosität $\mathcal{L}$. Sie charakterisiert die mögliche Anzahl N pro Zeiteinheit t an beobachteten Ereignissen eines bestimmten Prozesses mit dem Wirkungsquerschnitt σ . Es gilt

$$\frac{N}{t} = \mathcal{L} \cdot \sigma. \tag{3.1}$$

An HERA gibt es vier Experimentierhallen, wobei zwei, das H1 und das ZEUS-Experiment [ZEU93], beide Teilchenstrahlen verwenden und die beiden anderen jeweils nur einen. HERMES [Dür95] verwendet nur den Elektronenstrahl, der auf ein polarisiertes Gasziel (engl. target) geleitet wird, um die spinabhängige Protonstrukturfunktion zu messen. HERA-B [HER94] dagegen verwendet den Protonstrahl, in den am Randbereich ein Draht gefahren wird. Die Wechselwirkung mit dem Protonstrahl erzeugt eine bestimmte Reaktion über die die CP-Verletzung im b-quark-System gemessen werden soll.

3.2 Das H1-Experiment

Der H1-Detektor ist in der Experimentierhalle Nord aufgebaut und für den Nachweis von Elektron-Positron-Kollisionen konstruiert worden. Es werden bei möglichst vollständiger Raumwinkelabdeckung Teilchen idenfiziert und deren Energie und Spuren vermessen. Der ungleichen Energie der Teilchenstrahlen wird durch einen asymmetrischen Detektoraufbau Rechnung getragen. Der Schwerpunkt des Systems der erzeugten Teilchen einer Reaktion fliegt in der Regel in Protonrichtung weiter, daher gibt es im so definierten Vorwärtsbereich besonders viel Aktivität in den Detektorkomponenten. Die positive z-Achse des H1-Koordinatensystems wird durch die Protonrichtung definiert. Die x-Achse des rechtshändigen Systems zeigt zum Mittelpunkt des HERA-Ringes .

Die Experimentierhalle befindet sich ca. 20 Meter unter der Oberfläche. Die Ausmaße des Detektors betragen 10x12x15 m bei einem Gesamtgewicht von etwa 2800 t. Eine dreidimensionale Übersicht des Aufbaus gibt Bild 3.2. Der nominelle Wechselwirkungspunkt ist von einem Spurkammersystem $\boxed{2,3}$ umgeben, das wiederum von Kalorimetern $\boxed{4,5}$ eingeschlossen wird. Diese Hauptelemente befinden sich in einem 1.2 Tesla starken Magnetfeld, das von der supraleitenden Spule (Solenoid) $\boxed{6}$ erzeugt wird. Damit wird erreicht, daß Teilchen, die sich parallel zur z-Achse bewegen, auf Helixbahnen abgelenkt werden. Die Krümmung dieser Bahnen wird im Spurkammersystem gemessen und dient zur Impulsrekonstruktion des Teilchens. In den Kalorimetern wird die Energie der Teilchen gemessen, insbesondere das gestreute Elektron. Außerhalb der Spule befindet sich ein Eisenjoch $\boxed{10}$, das der Rückführung des magnetischen Flusses dient.



Abbildung 3.2: *Schematische dreidimensionale Darstellung des H1-Detektors*

Es ist außerdem so instrumentiert, daß dort Myonen nachgewiesen werden können. Im Vorwärtsbereich schließt sich ein weiteres System zur Messung von Myonen $\boxed{11}$ an. Eine detaillierte Beschreibung des H1-Experimentes findet man in [H1 96a, H1 96b]. Im weiteren wird nur auf die Komponenten eingegangen, die für die Datenanalyse in dieser Arbeit wichtig sind.

3.2.1 Das Spurkammersystem

Mit Hilfe des Spurkammersystems können die Flugbahnen einzelner geladener Teilchen im H1-Detektor genau vermessen werden. Anhand der Spurkrümmung kann der Teilchenimpuls rekonstruiert werden. Abbildung 3.3 zeigt einen Schnitt entlang der Strahlachse durch das Spurkammersystem. Das zentrale Kammersystem deckt einen Polarwinkelbereich von $20° \leq \theta \leq 160°$ ab und besteht aus mehreren Driftkammern. Ganz innen befinden sich die innere Proportionalkammer CIP und die innnere z-Kammer CIZ. Sie werden eingeschlossen von der zentralen Jetkammer CJC1. Ein analog aufgebautes System schließt sich im äußeren Bereich an, bestehend aus der COP, COZ und der zweiten Jetkammer CJC2.

Mit den konzentrischen Jetkammern, deren Drähte parallel zur Strahlachse gespannt sind, können Teilchenspuren mit einer Ortsauflösung von $\sigma_{r\phi} = 170$ μm in der x-y Ebene und $\sigma_z = 22$ μm gemessen werden. In den z-Driftkammern verlaufen die Drähte senkrecht zum Strahl und ermöglichen damit die Bestimmung der z-Koordinate der Teilchen, mit einer Ortsauflösung von $\sigma_z = 260$ μm. Die Lagen des Kammersystems sind gut im radialen Schnitt, dargestellt in Abb. 3.4, zu erkennen.

3.2.2 Zentrales und rückwärtiges Kalorimeter

Das Herzstück des H1-Detektors ist das Flüssig-Argon-Kalorimeter zur elektromagnetischen und hadronischen Energiemessung. Es stellt die Hauptkomponente für diese Analyse dar, weil mit dem Kalorimeter die Teilchen des hadronischen Endzustandes, aus denen die Jets gebildet werden, gemessen werden. Es deckt einen Polarwinkelbereich von $4° < \theta < 153°$ ab und ist ein nichtkompensierendes Kalorimeter, in dem als Absorber Blei und Stahl und als aktives Nachweismedium füssiges Argon (LAr) verwendet werden. Da man unterschiedliche Medien für Absorbtion und Messung der Energie der Teilchen vorfindet, gehört es zur Klasse der sogenannten "sampling"-Kalorimeter (engl. sampling = Stichprobenverfahren). Abbildung 3.5 zeigt einen Querschnitt durch das Kalorimeter. Man erkennt die Unterteilung in den elektromagnetischen (elm.) Teil, der 20-30 elm. Strahlungslängen X_0 mißt (jeweils Endung E) und den hadronischen (had.) Teil (Endung H), der einer Dicke von 4-8 had. Wechselwirkungslängen entspricht. Das Kalorimeter besteht aus acht Rädern mit jeweils acht Oktanten.

Das Kalorimeter ist sehr fein segmentiert, so daß 45000 Zellen einzeln ausgelesen werden können und sich damit eine sehr gute Ortsauflösung ergibt. Wenn hochenergetische Teilchen im Detektor nachgewiesen werden, deponieren sie ihre Energie nicht in einer einzelnen Zelle, sondern in einer Ansammlung von räumlich benachbarten Zellen. Diese werden zu sogenannten "Clustern" (engl. Haufen, Gruppe)) zusammengefaßt und bilden die Grundlage der Jetanalyse. Das Kalorimeter besitzt eine Energieauflösung



Abbildung 3.3: *Seitenansicht des Spurkammersystems*

für Elektronen [H1 94] von

$$\frac{\sigma(E)}{E} = \frac{12\%}{\sqrt{E}} \oplus 0.01. \tag{3.2}$$

Im hadronischen Teil wurde für Pionen im Teststrahl

$$\frac{\sigma(E)}{E} = \frac{50\%}{\sqrt{E}} \oplus 0.02 \tag{3.3}$$

gemessen [H1 93].



Abbildung 3.4: *Radialer Schnitt durch das Spurkammersystems*

Im Rückwärtsbereich von H1 befindet sich ein Spaghetti-Kalorimeter (SpaCal), das einen Winkelbereich von $155^\circ < \theta < 177.5^\circ$ abdeckt. Es besteht aus optischen Szintillatorfasern, die in Blei gelagert sind. Es ist ebenfalls in einen elektromag–netischen (elm.) und hadronischen (had.) Teil gegliedert. Eine Kreisfläche mit einem Radius von 80 cm wird mit 1192 elm. und 128 had. Zellen überdeckt. Die Winkelauflösung ist besser als 2 mrad.
Bei der Analyse von Daten mit kleinem Q^2 befindet sich das gestreute Elektron im rückwärtigen Bereich. Das SpaCal wird hier zur Elektronidentifikation und somit zur Bestimmung des DIS-Datensatzes eingesetzt. Es hat eine sehr gute Energieauflösung [H1 96c] von

$$\frac{\sigma_{elm}(E)}{E} = \frac{7\%}{\sqrt{E}} \quad , \quad \frac{\sigma_{had}(E)}{E} = \frac{30\%}{\sqrt{E}}. \tag{3.4}$$